MAX SCHÖNWETTER

HANDBUCH DER OOLOGIE

HERAUSGEGEBEN VON

Dr. WILHELM MEISE

Zoologisches Staatsinstitut und Zoologisches Museum Hamburg

Lieferung 13



AKADEMIE-VERLAG · BERLIN

1967

13. Lieferung

Seite 769—928

Inhaltsverzeichnis für die Lieferungen 1—13

Erschienen im Akademie-Verlag GmbH, 108 Berlin, Leipziger Straße 3—4

Lizenznummer: 202 · 100/580/67
Satz und Druck: VEB Druckhaus „Maxim Gorki“, 74 Altenburg
Bestellnummer: 3037/13 · ES 18 G 3 · 14,—

	A	B	g	d	G	Rg	
— *Phloeoceastes robustus* (Licht.)			(siehe Text)				S-Brasilien, Paraguay (= *Campephilus*)
17 *Campephilus p. principalis* (L.) 34,5—37,0 × 23,6—27,9 (nach Bent 1939)	35,4	25,9	—	—	13,0	—	Florida, Mississippi, Louisiana (im Aussterben)
			(siehe Text)				
6 *Campephilus magellanicus* (King) 30,8—37,7 × 23,0—25,8 (nach Goodall u. a. 1946 u. 1964)	32,9	23,9	—	—	10,4	—	S-Südamerika (von den Provinzen Nutle u. Neuquén südw.)



Liste der im Band I nicht behandelten Nonpasseres-Arten

Tinamidae (S. 38—46):

Tinamus osgoodi (Peru, Columbien)
Crypturellus kerriae (Columbien)
— *rubripes* (Unicum, Peru)
— *ptaritepui* (Venezuela)
— *brevirostris* (Guayana—Peru)
— *casiquiare* (Venezuela, Columbien)
Nothoprocta taczanowskii (Peru)
— *kalinowskii* (Unicum, Peru)

Spheniscidae (S. 47—51):

Spheniscus mendiculus (Galapagos)

Podicipedidae (S. 54—57):

Poliocephalus rufolavatus (Madagaskar)
Podiceps taczanowskii (Peru)
Podilymbus gigas (Guatemala)

Procellariidae (S. 61—68):

Pterodroma hasitata (Kl. Antillen, Bermudas)
— *incerta* (Tristan da Cunha)
— *rostrata* (Neu-Caledonien usw., einschl. *becki*,? Salomon-Inseln)
— *ultima* (Tuamotu-, Austral.- u. and. Inseln)
Bulweria macgillivrayi (Fidschi)
— *fallax* (NW-Indischer Ozean)

Hydrobatidae (S. 68—70):

Oceanites gracilis (Galapagos)
Oceanodroma hornbyi (Chile)

Ardeidae (S. 84—95):

Ardea humbloti (Madagaskar)
Butorides sundevalli (Galapagos)
Erythocnus rufiventris (S-Afrika)
Ardeola idae (Madagaskar)
Oroanassa magnifica (Hainan)
Zonerodius heliosylus (Neuguinea)
Tigriornis leucolopha (W-Afrika)
Tigrisoma fasciatum, einschl. *salmoni* (Costa Rica–Argentinien)
Trigrisoma mexicanum (Mexico—Columbien)
Zebrilus undulatus (Venezuela—Peru)

Threskiornithidae (S. 101—108):

Thaumatibis gigantea (Hinterindien)
Lampribis rara (W-Afrika)
Theristicus branickii (Ecuad.—Boliv.)

Anatidae (S. 112—134):

Cyanochen cyanopterus (Abessinien)
Anas luzonica (Philippinen)
— *leucophrys* (*Calonetta*) (La Plata)
Pteronetta hartlaubii (W-Afrika)
Tadorna cristata (Korea, Ussuriland, ausgestorben)
Mergus squamatus (Ussuri-Gebiet)
— *australis* (Neuseeland, ausgestorben)

Cathartidae (S. 135—137):

Cathartes melambrotos (Südamerika)

Accipitridae (S. 136—178):

Gampsonyx swainsonii (Südamerika)
Henicopernis longicauda (Papuan. Region)
Pernis ptilorhynchus (Malaya, Philipp.)
Chondrohierax uncinatus (Cuba, Mexico—Argentinien)[1]
Odontriorchis palliatus (*Leptodon cayanensis*) (Mexico—N-Argentinien)[1]
Helicolestes hamatus (Panama, Südamerika)
Accipiter meyerianus (Papua)
— *bürgersi* (Papua)
— *castanilius* (W-Afrika)
— *imitator* (Salomon-Inseln)
— *poliocephalus* (Papua)
— *princeps* (Neubritannien)
— *melanochlamys* (Neuguinea)
— *griseiceps* (Celebes)
— *gundlachi* (Cuba)
— *pectoralis* (Papua)

---

[1]) Vgl. F. Haverschmidt, Journ. f. Ornith. 105, S. 64—66, 1964

Accipiter chilensis (südl. Südamerika)
— *albogularis* (Salomonen u. Feni)
— *luteoschistaceus* (Neubritannien)
— *henicogrammus* (Molukken)
— *collaris* (Columbien, Ecuad., Venez.)
— *poliogaster* (Südamerika)
— *brachyurus* (Neubritannien)
— *erythrauchen* (Molukken)
— *nanus* (Celebes)
Erythrotriorchis doriae (Neuguinea)
Urotriorchis macrourus (W-Afrika)
Buteo poecilochrous (Südamerika)
— *albigula* (Chile)
— *galapagoensis* (Galapagos)
— *ridgwayi* (Hispaniola)
— *solitarius* (Hawaii)
Leucopternis melanops (N-Südamerika)
— *semiplumbea* (Nicaragua—Ecuador)
— *lacernulata* (Brasilien)
— *schistacea* (Panama—Peru)
— *princeps* (Panama—Ecuador)
Pithecophaga jefferyi (Philippinen)
Harpyopsis novaeguineae (Neuguinea)
Oroaetus isidori (Venezuela—Argentin.)
Spizaetus ornatus (Mexico—Argentin.)
— *tyrannus* (Mexico—Bolivien)
— *lanceolatus* (Celebes)
— *alboniger* (Tenasserim—Borneo)
— *nanus* (Große Sunda-Inseln)
— *philippensis* (Philippinen)
— *gurneyi* (Molukken, Neuguinea)
Cassiniaetus africanus (W-Afrika)
Haliaeetus vociferoides (Madagaskar)
Spilornis minimus (Nicobaren)
— *elgini* (Andamanen)
— *rufipectus* (Celebes, Borneo)
— *holospilus* (Philippinen)
Dryotriorchis spectabilis (W-Afrika)
Eutriorchis astur (Madagaskar)

Falconidae (S. 153, 179—195):

Micrastur semitorquatus (Mexico—Argentinien)
— *mirandollei* (Costa Rica—Peru)
— *ruficollis* (Mexico—Argentinien)
Spiziapteryx circumcinctus (Argentin.)
Microhierax latifrons (Borneo)
Falco kreyenborgi (Südamerika)
— *zoniventris* (Madagaskar)
— *araca* (Seychellen)

Megapodiidae (S. 196—201):

Megapodius tenimberensis (Tenimber)
Aepypodius oruijni (Waigeu)

Cracidae (S. 202—206):

Mitu salvini (Ecuador, Peru, Columbien)
Penelope ortoni (W-Columb.—W-Ecuador)
— *albipennis* (Peru)
— *montagnii* (Columbien—Bolivien)
— *dabbenei* (Bolivien, Argentinien)
— *ochrogaster* (Brasilien)
— *argyrotis* (Venezuela—Peru)
Penelopina nigra (S-Mexico—Nicaragua)
Chamaepetes unicolor (Costa Rica—Panama)

Phasianidae (S. 211, 217—285):

Dendrortyx barbatus (Mexico)
Philortyx fasciatus (Mexico)
Odontophorus hyperythrus (Columbien)
— *speciosus* (Ecuador—Bolivien)
— *strophium* (Columbien)
— *columbianus* (Venezuela)
— *atrifrons* (Columbien, Venezuela)
— *leucolaemus* (Costa Rica—Panama)
Tetraophasis széchenyii (SO-Tibet)
Anurophasis monorthonyx (Neuguinea)
Francolinus finschi (Angola)
— *harwoodi* (Abessinien)
— *hartlaubi* (Angola, SW-Afrika)
— *swierstrai* (Angola)
— *griseostriatus* (Angola)
— *nobilis* (Kongo, Uganda)
Arborophila rufipectus (Unicum, O-Sikang)
— *gingica* (SO-China)
— *davidi* (Unicum, Indochina)
— *cambodiana* (Cambodscha, Siam)
— *rubrirostris* (Sumatra)
— *hyperythra* (Borneo)
— *ardens* (Hainan)
Tropicoperdix chloropus (Burma—Indochina)
— *merlini* (Annam)
Haematortyx sanguiniceps (Borneo)
Ophrysia superciliosa (Himalaja)
Chalcurus inopinatus (Malay. Halbinsel)

Turnicidae (S. 295—299):

Turnix worcesteri (Philippinen)
— *everetti* (Sumba)

Psophiidae (S. 307—308):

Psophia viridis (Brasilien)

Rallidae (S. 308—353):

Rallus semiplumbeus (Columbien)
— *mirificus* (Philippinen)
— *muelleri* (Auckland, ausgestorben)
— *ecaudatus* (Tahiti, ausgestorben)

Nesolimnas dieffenbachii (Chatham Inseln, ausgestorben)
Rallicula rubra (Neuguinea)
— *leucospila* (Neuguinea)
Cyanolimnas cerverai (Cuba)
Aramides wolfi (Ecuad., Columb.)
— *calopterus* (O-Ecuador)
Aramidopsis plateni (Celebes)
Nesoclopeus woodfordi (Salomonen)
Gymnocrex rosenbergii (Celebes)
Habropteryx wallacei (Halmahera)
Megacrex inepta (Neuguinea)
Porzana flaviventer (Große Antillen, El Salvador—N-Argentinien)
Pennula millsi (Hawaii, ausgestorben)
— *sandwichensis* (Hawaii, ausgestorben)
Nesophylax ater (Paumotu Inseln)
Aphanolimnas monasa (Carolinen)
Laterallus spilopterus (Argent., Urug.)
— *ruber* (Mittelamerika)
— *levraudi* (N-Venezuela)
Coturnicops ayresi (Abessinien, S-Afrika)
Sarothrura lugens (Tanganjika, Kongo)
— *watersi* (Madagaskar)
Amaurornis olivieri (Madagaskar)
Edithornis silvestris (Salomonen)
Porphyrio pulverulentus (Philippinen, Talaud Inseln)

Charadriidae (S. 375—388):
Anomalophrys superciliosus (W-Afrika)
Charadrius pallidus (*venustus*) (S- u. O-Afrika)
— *alticola* (Peru—Argentinien)
— *thoracicus* (Madagaskar)
Phegornis mitchellii (Peru—Chile)

Scolopacidae (S. 382, 389—414):
Aechmophorus cancellatus (Christmas Insel, Pazifik, ausgestorben)
— *parvirostris* (Paumotu Inseln)
Prosobonia leucoptera (Gesellschafts-Inseln, ausgestorben)
Heteroscelus brevipes (O-Sibirien)
Scolopax celebensis (Celebes)
— *rochussenii* (Molukken)

Thinocoridae (S. 424—427):
Attagis malouinus (S-Südamerika)

Laridae (S. 431—457):
Thalasseus zimmermanni (O-China)

Columbidae (S. 475—507):
Sphenurus seimundi (Malaya, Annam)
Treron s. thomae (S. Tomé)
Phapitreron amethystina (Philippinen)
Leucotreron occipitalis (Philippinen)
Leucotreron subgularis (Philippinen, Celebes, Sula)
— *merrilli* (Philippinen)
— *marchei* (Philippinen)
— *leclancheri* (Philippinen)
— *cincta* (Bali—N-Australien)
— *dohertyi* (Sumba)
— *porphyrea* (Sumatra, Java, Bali)
Ptilinopus dupetithouarsii (Marquesas)
— *purpuratus* (Gesellschafts-Inseln)
— *insularis* (Henderson Insel)
— *rarotongensis* (Rarotonga)
— *huttoni* (Rapa in der Austral-Gruppe)
— *greyii* (Neu-Caledonien u. and. Ins.)
— *viridis* (Molukken)
— *naina* (W-Papuan. Inseln, S-Neuguinea)
— *hyogaster* (Molukken)
— *granulifrons* (Molukken)
— *jambu* (Malay. Halbinsel, Born., Sumatra)
— *ornatus* (Neuguinea)
— *tannensis* (Neue Hebriden, Banks Ins.)
Alectroenas pulcherrima (Seychellen)
— *sganzini* (Aldabra, Comoren)
Megaloprepia formosa (N-Molukken)
Ducula galeata (Marquesas Inseln)
— *aurorae* (Tahiti)
— *oceanica* (Carolinen, Marshall Ins.)
— *whartoni* (Christmas Insel, Ind. Ozean)
— *rosacea* (Kleine Ins. von W-Java—SO-Inseln)
— *perspicillata* (Molukken)
— *pickeringii* (Philippinen u. Nachbarins.)
— *bakeri* (Neue Hebriden)
— *goliath* (Neu-Caledonien)
— *cineracea* (Timor, Wetar)
— *mullerii* (Neuguinea)
— *melanochroa* (Bismarckarchipel)
— *poliocephala* (Philippinen)
— *forsteni* (Celebes)
— *mindorensis* (Mindoro)
— *finschii* (Bismarckarchipel)
— *chalconota* (Neuguinea)
— *carola* (Philippinen)
Cryptophaps poecilorrhoa (Celebes)
Gymnophaps albertisii (Batjan—Bismarckarchipel)
— *mada* (Buru, Ceram)
Columba oliviae (Somalia)
— *unicincta* (W-Afrika—Uganda)
— *albinucha* (NO-Kongo, Uganda)
— *oenops* (Peru)
— *caribaea* (Jamaica)
— *palumboides* (Andamanen, Nicobaren)

Columba versicolor (Bonin-Inseln, ausgestorben)
— *jouyi* (Riu-Kiu Inseln)
— *pallidiceps* (Bismarckarchipel, Salomonen)
— *argentina* (Inseln bei Borneo, ferner Sumatra)
— *pollenii* (Comoren)
— *nigrirostris* (S-Mexico—Panama)
— *goodsoni* (Columbien, NW-Ecuador)
— *subvinacea* (W-Columbien, NW-Ecuador)
— *chiriquensis* (Unicum, Panama)
— *iriditorques* (W-Afrika—Ituri)
— *malherbii* (Principe, S. Tomé, Annobon)
Nesoenas mayeri (Mauritius, ausgestorben)
Turacoena manadensis (Celebes, Sula)
— *modesta* (Timor, Wetar)
Macropygia nigrirostris (Papuan. Region)
Reinwardtoena reinwardtsi (Molukken bis Papuan. Inseln)
— *browni* (Neubritannien)
Coryphoenas crassirostris (Salomonen)
Zenaidura graysoni (Mexico)
Nesopelia galapagoensis (Galapagos)
Streptopelia lugens (Nigeria u. Jemen bis Niassaland)
Metriopelia morenoi (NW-Argentinien)
Columbigallina buckleyi (Ecuador, Peru)
Henicophaps albifrons (Neuguinea)
— *foersteri* (Neubritannien)
Petrophassa rufipennis (N-Australien)
Osculatia saphirina (Columbien—Peru)
Oreopeleia veraguensis (Costa Rica—Ecuad.)
— *lawrencii* (Costa Rica—Panama)
— *goldmani* (O-Panama—N-Columbien)
— *costaricensis* (Costa Rica, Panama)
— *caniceps* (Cuba, Hispaniola)
— *chiriquensis* (Costa Rica—Panama)
— *erythropareia* (O-Ecuador)
Gallicolumba platenae (Mindoro)
— *keayi* (Negros)
— *menagei* (Tawi Tawi, Philippinen)
— *rufigula* (Neuguinea)
— *tristigmata* (Celebes)
— *salamonis* (San Christobal, Salomonen)
— *sanctaecrucis* (Santa Cruz Inseln)
— *canifrons* (Palau Inseln)
— *xanthonura* (Marianen, Carolinen)
— *kubaryi* (Carolinen)
— *erythroptera* (Gesellschafts- u. Tuamotu Inseln)
— *rubescens* (Marquesas Inseln)
Gallicolumba hoedtii (Wetar)
Trugon terrestris (Neuguinea)
Microgoura meeki (Salomonen)

Psittacidae (S. 508—529):

Chalcopsitta atra (W-Papuan. Inseln)
— *insignis* (Neuguinea)
— *scintillata* (Neuguinea)
— *duivenbodei* (Neuguinea)
— *cardinalis* (Salomonen, Nachbarins.)
Eos histrio (Sangir, Talaud Inseln)
— *bornea* (Molukken, Kai Inseln)
— *semilarvata* (Ceram)
— *goodfellowi* (Obi)
Trichoglossus ornatus (Celebes-Region)
— *rubiginosus* (Ponape)
— *euteles* (Kl. Sunda Inseln)
Psitteuteles flavoviriris (Celebes, Sula Inseln)
— *johnstoniae* (Mindanao)
— *goldiei* (Neuguinea)
— *iris* (Wetar, Timor)
Domicella hypoinochroa (Neuguinea, O-Papuan. Inseln)
— *amabilis* (Neubritannien)
— *lory* (Neuguinea)
— *chlorocercus* (Salomonen)
— *albidinucha* (Neuirland)
Vini kuhlii (Austral.- u. and. polynes. Ins.)
— *stepheni* (Henderson Insel)
— *peruviana* (Gesellschaftsinseln)
— *ultramarina* (Marquesas Inseln)
Charmosyna palmarum (Neue Hebriden u. andere Polynes. Inseln)
— *meeki* (Salomonen)
— *rubrigularis* (Papuanische Region)
— *aureicincta* (Fidschi Inseln)
— *diadema* (Neu-Caledonien)
— *toxopei* (Buru)
— *rubronotata* (Papuan. Region)
— *multistriata* (Neuguinea)
— *pulchella* (Neuguinea)
— *margarethae* (Salomonen)
— *josefinae* (Neuguinea)
— *papou* (Neuguinea)
Oreopsittacus arfaki (Neuguinea)
Neopsittacus musschenbroekii (Neuguinea)
— *pullicauda* (Neuguinea)
Psittaculirostris desmarestii (Neuguinea u. Inseln)
— *salvadorii* (Neuguinea)
Opopsitta gulielmi III (Neuguinea)
Micropsitta keiensis (Neuguinea, Inseln)
— *geelvinkiana* (Ins. d. Geelvink-Bucht)

Micropsitta meeki (Papuan. Inseln)
— *finschii* (Bismarckarchipel, Salomon.)
Cacatua haematuropygia (Philippinen)
Anodorhynchus hyacinthinus (Brasilien)
— *glaucus* (Brasilien, Argentinien)
— *leari* (Brasilien)
Ara caninde (Paraguay, Argentinien)
— *tricolor* (Cuba, ausgestorben)
— *rubro-genys* (Brasilien)
— *auricollis* (Bolivien—Argentinien, Brasilien)
— *spixii* (Brasilien)
— *manilata* (Venezuela—Peru, Bahia)
— *couloni* (Peru)
— *nobilis* (Venezuela—Brasilien)
Aratinga holochlora (Mexico—Nicaragua)
— *finschi* (Nicaragua—Panama)
— *wagleri* (Columbien—Peru)
— *mitrata* (Peru—Argentinien)
— *chloroptera* (Große Antillen)
— *euops* (Cuba)
— *weddellii* (S-Amazonien)
— *nana* (Jamaica)
Leptosittace branickii (Ecuador, Peru)
Ognorhynchus icterotis (Columbien, Ecuador)
Pyrrhura cruentata (Brasilien)
— *devillei* (Bolivien, Brasilien)
— *perlata* (Brasilien)
— *rhodogaster* (Brasilien)
— *leucotis* (Venezuela, Brasilien)
— *viridicata* (Columbien)
— *egregia* (Guayana)
— *melanura* (Columbien—Peru)
— *berlepschi* (Peru)
— *rupicola* (Peru, Bolivien)
— *albipectus* (Ecuador)
— *calliptera* (Columbien)
— *rhodocephala* (Venezuela)
— *hoffmanni* (Costa Rica—Panama)
Amoropsittaca aymara (Bolivien, Argentinien)
Bolborhynchus ferrugineifrons (Unicum, Columbien)
Forpus cyanopygius (Mexico)
Nannopsittaca panychlora (Guayana, Venezuela)
Touit purpurata (Guayanas, Bras., Venez.)
— *melanonota* (Brasilien)
— *huetii* (Trinidad—Peru)
— *dilectissima* (Costa Rica—Venezuela)
— *surda* (Brasilien)
— *stictoptera* (Columbien—Ecuador)
Pionites melanocephala (Venezuela—Brasilien)
Pionites leucogaster (Ecuador—O-Brasilien)
Pionopsitta haematotis (Mexico—Ecuador)
— *caïca* (Guayanas)
— *barrabandi* (Columbien—Brasilien)
— *pyrilia* (Panama—W-Venezuela)
Hapalopsittaca melanotis (Peru, Boliv.)
— *amazonina* (Columbien—Ecuador)
Gypopsitta vulturina (Venezuela—Amazonas)
Graydidasculus brachyurus (Amazonien)
Pionus sordidus (Columbien—Bolivien)
— *tumultuosus* (Peru, Bolivien)
— *seniloides* (Columbien, Ecuador, Venez.)
— *senilis* (Mexico—Panama)
— *chalcopterus* (Columbien—Peru)
— *fuscus* (Columbien, Guayanas—N-Bras.)
Amazona ventralis (Große Antillen)
— *xantholora* (Mexico, Honduras)
— *agilis* (Jamaica)
— *pretrei* (Brasilien—Argentinien)
— *autumnalis* (Mexico—Brasilien)
— *dufresniana* (Guayana—Brasilien)
— *brasiliensis* (Brasilien)
— *arausiaca* (Kl. Antillen)
— *festiva* (Venezuela—Peru)
— *barbadensis* (Venezuela)
— *guildingii* (Kl. Antillen)
— *versicolor* (Kl. Antillen)
— *imperialis* (Kl. Antillen)
Triclaria malachitacea (Brasilien)
Poicephalus gulielmi (W-Afrika—Tanganj.)
— *flavifrons* (Abessinien)
— *senegalus* (W-Afrika)
— *rufiventris* (Abessinien—Tanganjika)
Psittrichas fulgidus (Neuguinea)
Geoffroyus geoffroyi (Kl. Sunda Inseln u. Nachbarinseln)
— *simplex* (Neuguinea)
— *heteroclitus* (Bismarckarchipel, Salomonen)
Prioniturus luconensis (Philippinen)
— *discurus* (Philippinen)
— *flavicans* (Philippinen—Celebes)
— *platurus* (Talaud-Ins., Celebes)
— *mada* (Buru)
Tanygnathus lucionensis (Philippinen, Talaud Ins.)
— *mulleri* (Philippinen—Celebes)
— *gramineus* (Buru)
— *heterurus* (Heimat unbekannt)
— *megalorhynchos* Talaud—W-Papua
Mascarinus mascarinus (Réunion, ausgestorben)
Psittacula caniceps (Nicobaren)

Psittacula exsul (Rodriguez, ausgestorben)
— *roseata* (Indien)
— *intermedia* (Indien)
Aprosmictus jonquillaceus (Timor, Wetar)
Alisterus chloropterus (Neuguinea)
Psittacella brehmii (Neuguinea)
— *picta* (Neuguinea)
— *modesta* (Neuguinea)
Bolbopsittacus lunulatus (Philippinen)
Agapornis swinderniana (W-Afrika—Uganda)
Loriculus philippensis (Philippinen)
— *exilis* (Celebes)
— *aurantiifrons* (Papuan. Region)
Cyanoramphus zealandicus (Tahiti, ausgestorben)
— *ulietanus* (Gesellschafts-Ins., ausgestorben)

Musophagidae (S. 530—533):
Tauraco schüttii (Kongo)
— *fischeri* (O-Afrika, Sansibar)
— *bannermani* (Kamerun)
— *ruspolii* (Abessinien, zu *leucotis*?)
— *leucolophus* (Mittel-Afrika)
Gallirex porphyreolophus (O-, SO-Afrika)
Ruwenzonornis johnstoni (Kongo, Ruanda)

Cuculidae (S. 531, 534—598):
Cuculus crassirostris (Celebes)
— *vagans* (Java, Borneo)
Cercococcyx mechowi (W-Afrika—Uganda)
Cacomantis heinrichi (Halmahera, Batjan)
Rhamphomantis megarhynchus (Waigeu, Neuguinea)
Chrysococcyx flavigularis (W-Afrika—Ituri)
Chalcites crassirostris (Molukken, Neuguinea)
— *ruficollis* (Neuguinea)
— *meyeri* (Neuguinea)
Caliechthrus leucolophus (Neuguinea)
Microdynamis parva (Neuguinea)
Morococcyx erythropygus (Mexico)
Coccyzus pumilus (Orinoco, Columbien)
— *euleri* (NO-Columbien—Brasilien)
Dasylophus superciliosus (Philippinen)
Lepidogrammus cumingi (Philippinen)
Neomorphus geoffroyi (Nicaragua—Bras.)
— *squamiger* (Tapajoz)
— *radiolosus* (W-Ecuador, SW-Columbien)
— *pucheranii* (Ecuador—Brasilien)
Coua delalandei (Madagaskar, ausgestorben)
— *gigas* (Madagaskar)
— *serriana* (Madagaskar)
— *cursor* (Madagaskar)
— *ruficeps* (Madagaskar)
Coua verreauxi (Madagaskar)
Centropus milo (Salomonen)
— *goliath* (N-Molukken)
— *chalybeus* (Biak, Numfor)
— *steerii* (Philippinen)
— *nigrorufus* (Sumatra, Java)
— *leucogaster* (W-Afrika—Uelle)
— *anselli* (W-Afrika—Mittel-Kongo)
— *celebensis* (Celebes)
— *unirufus* (Philippinen)

Tytonidae (S. 599—601):
Tyto inexpectata (N-Celebes)
— *aurantia* (Neubritannien)
Phodilus prigoginei (Kongo)

Strigidae (S. 599, 602—623):
Otus rufescens (Malaya—Sulu)
— *icterorhynchus* (Ghana—Ituri)
— *vandewateri* (Sumatra)
— *alfredi* (Flores)
— *umbra* (Simalur)
— *brookii* (Sumatra, Java, Borneo)
— *manadensis* (Celebes, Philippinen, Kl. Sunda Inseln)
— *beccarii* (Biak)
— *silvicola* (Flores, Sumbawa)
— *whiteheadi* (Luzon)
— *insularis* (Seychellen)
— *guatemalae* (Mexico—Bolivien)
— *cooperi* (Mexico—Costa Rica)
— *ingens* (Columbien—Bolivien)
— *watsonii* (Columbien—N-Argentinien)
— *clarkii* (Costa Rica-Panama)
Mimizuku gurneyi (Philippinen)
Jubula lettii (W-Afrika—Kongo)
Bubo shelleyi (Liberia—Kamerun)
— *leucostictus* (W-Afrika—Kongo)
Pseudoptynx philippensis (Philippinen)
Ketupa blakistoni (Mandschur. Gebiet)
Scotopelia ussheri (Sierra Leone—Ghana)
— *bouvieri* (Liberia—Kongo)
Pulsatrix koeniswaldiana (Südamerika)
— *melanota* (Ecuador, Peru)
Glaucidium jardinii (Costa Rica—Peru)
— *tephronotum* (Ghana—Kenia)
Uroglaux dimorpha (Japen, Neuguinea)
Ninox rufa (Neuguinea, N-Australien)
— *affinis* (Andamanen, Nicobaren)
— *philippensis* (Philippinen)
— *spilonota* (Philippinen)
— *spilocephala* (Philippinen)

Ninox perversa (Celebes)
— *squamipila* (Molukken)
— *theomacha* (Neuguinea)
— *punctulata* (Celebes)
— *meeki* (Admiralitäts-Inseln)
— *solomonis* (Neubritannien, Neuhann.)
— *jacquinoti* (Salomonen)
Ciccaba nigrolineata (Mexico—Ecuador)
— *huhula* (Guayana—Brasilien)
— *albitarsus* (Columbien, Ecuad., Venez.)
Strix butleri (SW-Asien)
— *hylophila* (Brasilien, Argentinien)
— *davidi* (Szetschwan)
Asio stygius (Mexico—Argentinien)
— *abyssinicus* (Abessinien—Kongo)
— *madagascariensis* (Madagaskar)
Pseudoscops grammicus (Jamaica)
Nesasio solomonensis (Salomonen)
Aegolius ridgwayi (Guatemala—Costa Rica)
— *harrisii* (Columbien—N-Argentinien)

Podargidae (S. 625—627):
Batrachostomus auritus (Malaya—Borneo)
— *harterti* (Borneo)

Nyctibiidae (S. 628—630):
Nyctibius leucopterus (Columbien Bras.)
— *bracteatus* (Columbien—Peru)

Aegothelidae (S. 630, 631):
Aegotheles crinifrons (Molukken)
— *insignis* (Neuguinea)
— *savesi* (Neu Caledonien)
— *wallacii* (Neuguinea)
— *albertisi* (Neuguinea)

Caprimulgidae (S. 631—651):
Eurostopodus diabolicus (Celebes)
— *archboldi* (Neuguinea)
Veles binotatus (W-Afrika)
Otophanes mcleodii (Mexico)
— *yucatanicus* (Mexico)
Caprimulgus ridgwayi (Mexico—Honduras)
— *saturatus* (Costa Rica, W-Panama)
— *maculosus* (Cayenne)
— *hirundinaceus* (Brasilien)
— *stellatus* (NO-Afrika)
— *centralasicus* (Tarim-Becken)
— *concretus* (Sumatra, Borneo)
— *pulchellus* (Sumatra, Java)
Uropsalis lyra (Columbien—Peru)

Apodidae (S. 652—662):
Collocalia leucophaea (Polynesien)
— *vestita* (Gr. Sunda Inseln, Philippinen)
— *hirundinacea* (Neuguinea)
Collocalia troglodytes (Philippinen)
Hirund-apus ernsti (Java)
Streptoprocne biscutata (Brasilien)
Chaetura richmondi (Mexico—Panama)
— *gaumeri* (Yucatan)
— *leucopygialis* (Tenasserim—Java, Borneo)
— *thomensis* (S. Tomé)
— *nubicola* (Mexico)
— *ussheri* (Afrika)
— *melanopygia* (Kamerun, Kongo)
Zoonavena grandidieri (Madagaskar)
Mearnsia picina (Philippinen)
— *novaeguineae* (Neuguinea)
— *cassini* (Nigeria—Kongo, Fern. Po)
Cypseloides cherriei (Costa Rica)
— *fumigatus* (Panama—Peru)
— *cryptus* u. *lemoni* (Columbien)
Apus aequatorialis (Afrika)
— *toulsoni* (Angola)
— *myoptilus* (Kenia—Angola, Fern. Po)
— *andecolus* (Peru—Chile)
Panyptila sancti-hieronymi (Guatemala)
Micropanyptila furcata (NW-Venezuela)

Trochilidae (S. 665—680):

(Verbreitung der nicht behandelten Arten auf Mittel- und Südamerika beschränkt, daher nicht im einzelnen angeführt. Nur *Atthis heloisa* kommt in den USA vor.)
Doryfera johannae
Androdon aequatorialis
Threnetes niger
Phaethornis yaruqui, syrmatophorus, malaris, anthophilus, bourcieri, philippii, subochraceus, gounellei, rupurumii, griseogularis
Eutoxeres aquila, condamini
Phaeochroa cuvierii
Campylopterus curvipennis, largipennis, rufus, hyperythrus, ensipennis, phainopeplus, villaviscensio
Anthracothorax prevostii, veraguensis, viridis
Avocettula recurvirostris
Eulampis jugularis
Klais guimeti
Abeillia abeillei
Lophornis delattrei, stictolopha, melaniae
Polemistria pavonina
Lithiophanes insignibarbis
Paphosia helenae, adorabilis
Popelairia popelairii, letitiae, conversii
Discosura longicauda

Chlorostilbon vitticeps, maugaeus, russatus, inexpectatus, alice, poortmani, auratus
Cynanthus sordidus
Ptochopira iolatema
Cyanophaia bicolor
Thalurania lerchi
Neolesbia nehrkorni
Panterpe insignis
Damophila julie
Lepidopyga coeruleogularis, lilliae, goudoti, luminosa
Hylocharis eliciae, grayi
Goldmania violiceps
Goethalsia bella
Waldronia milleri
Leucippus fallax, baeri, chionogaster, viridicauda
Talaphorus hypostictus, taczanowskii, chlorocercus
Amazilia candida, hollandi, luciae, amabilis, cyaneotincta, rosenbergi, boucardi, franciae, veneta, microrhyncha, cyanifrons, beryllina, cyanura, viridigaster, edward, rutila, castaneiventris, amazilia, violiceps, distans
Eupherusa eximia
Elvira chionura, cupreiceps
Microchera albocoronata
Chalybura buffonii, urochrysia
Lampornis amethystinus, viridipallens, hemileucus, cinereicauda
Lamprolaima rhami
Anthocephala floriceps
Urosticte benjamini
Phlogophilus hemileucurus, harterti
Polyplancta aurescens
Heliodoxa rubinoides, leadbeateri, jacula, xanthogonys
Ionolaima schreibersii
Agapeta gularis
Lampraster branicki
Eugenia imperatrix
Hylonympha macrocerca
Sternoclyta cyanopectus
Topaza pyra
Oreotrochilus stolzmanni, melanogaster, bolivianus adela
Urochroa bougueri
Aglaeactis aliciae, castelnaudii, pamela
Lafresnaya lafresnayi
Coeligena coeligena, wilsoni, prunellei, phalerata, eos, bonapartei, orina, helianthea, lutetiae, violifer, iris
Boissonneaua matthewsii, jardini
Heliangelus mavors, amethysticollis, micraster, squamigularis, speciosus, rothschildi, luminosus
Eriocnemis nigrivestis, vestitus, godini, isaacsonii, mosquera, glaucopoides, alinae, derbyi
Haplophaedia aureliae
Lesbia victoriae
Sappho sparganura
Polyonymus caroli
Zodalia glyceria
Ramphomicron dorsale
Metallura phoebe, theresiae, purpureicauda, aeneocauda, malagae, eupogon, williami, iracunda, ruficeps
Chalcostigma olivaceum, stanleyi, heteropogon, herrani
Opisthoprora euryptera
Taphrolesbia griseiventris
Aglaiocercus kingi, emmae, coelestis
Oreonympha nobilis
Schistes geoffroyi
Heliothryx barroti
Heliomaster constantii, longirostris
Rhodopis vesper
Thaumastura cora
Philodice evelynae, bryantae, mitchellii
Doricha eliza
Tilmatura dupontii
Microstilbon burmeisteri
Calothorax pulcher
Calypte helenae
Atthis heloisa
Myrtis fanny
Eulidia yarrellii
Myrmia micrura
Acestrura mulsanti, decorata, bombus, berlepschi
Selasphorus flammula, simoni, ardens

Coliidae (S. 681—683):

Colius castanotus (W-Afrika)
— *leucocephalus* (NO-Afrika)

Trogonidae (S. 684—688):

Euptilotis neoxenus (Mexico)
Temnotrogon roseigaster (Hispaniola)
Trogon clathratus (Costa Rica, Panama)
— *melanurus* (Panama—Brasilien)
— *aurantiiventris* (Costa Rica—Panama)
Heterotrogon vittatus (Afrika)

Harpactes kasumba (Malakka, Sumatra, Borneo)
— *diardii* (Malaya, Sumatra, Borneo)
— *whiteheadi* (Borneo)
— *orrhophaeus* (Malaya, Sumatra, Borneo)
— *wardi* (Burma, Indochina)

Alcedinidae (S. 689—703):

Alcedo leucogaster (W-Afrika)
Myioceyx lecontei (W-Afrika—Uganda)
Ceyx cyanopectus (Philippinen)
— *argentauris* (Philippinen)
— *websteri* (Bismarckarchipel)
— *melanurus* (Philippinen)
— *fallax* (Celebes)
Pelargopsis melanorhynchus (Celebes)
Dacelo tyro (Neuguinea)
Clytoceyx rex (Neuguinea)
Melidora macrorrhina (Neuguinea)
Cittura cyanotis (Celebes)
Halcyon senegaloides (O-Afrika)
— *nigrocyanea* (Neuguinea)
— *winchelli* (Philippinen)
— *diops* (Molukken)
— *leucopygia* (Salomonen)
— *farquhari* (Neue Hebriden)
— *megarhyncha* (Neuguinea)
— *australasia* (Kl. Sunda Inseln)
— *cinnamomina* (Polynesien)
— *funebris* (Molukken)
— *venerata* (Polynesien)
— *tuta* (Polynesien)
— *gambieri* (Polynesien)
— *godeffroyi* (Polynesien)
— *miyakoensis* (Riu—Kiu Inseln, ausgestor-[ben)
— *bougainvillei* (Salomonen)
— *lindsayi* (Philippinen)
— *fulgida* (Kl. Sunda Inseln)
— *monacha* (Celebes)
Tanysiptera hydrocharis (Neuguinea)
— *carolinae* (Numfor)
— *ellioti* (Kofiau)
— *nympha* (Neuguinea)

Todidae (S. 704):

Todus angustirostris (Cuba)

Momotidae (S. 704—706):

Hylomanes momotula (Mexico—Columbien)
Electron carinatum (Mexico—Costa Rica)

Meropidae (S. 707/708):

Melittophagus revoilii (Somalia—Kenia)
— *mülleri* (Sierra Leone— Kenia)
Meropogon forsteni (Celebes)

Coraciidae (S. 711—713):

Brachypteracias leptosomus (Madagaskar)
— *squamigera* (Madagaskar)
Atelornis crossleyi (Madagaskar)
Uratelornis chimaera (Madagaskar)

Phoeniculidae (S. 714—717):

Phoeniculus castaneiceps (W-Afrika—Kenia)
— *aterrimus* (W-Afrika—Abessinien)

Bucerotidae (S. 715—723):

Tockus hemprichii (NO-Afrika)
— *hartlaubi* (W-Afrika—Uganda)
— *camurus* (W-Afrika—Ruwenzori)
— *deckeni* (NO-Afrika)
Tropicranus albocristatus (W-Afrika)
Berenicornis comatus (Tenasserim—Borneo)
Anorrhinus galeritus (Tenasserim—Borneo)
Rhyticeros corrugatus (Malaya—Borneo)
— *leucocephalus* (Philippinen)
— *cassidix* (Celebes)
— *everetti* (Sumba)
— *narcondami* (Narcondam in der Bucht von Bengalen)
Anthracoceros montani (Sulu-Archipel)
— *marchei* (Palawan-Archipel)
Ceratogymna elata (Afrika)
Bycanistes cylindricus (Afrika)
— *subcylindricus* (Afrika)

Galbulidae (S. 724—726):

Galbalcyrhynchus leucotis (Amazonien)
Brachygalba lugubris (Südamerika)
— *goeringi* (Columbien, Venezuela)
— *salmoni* (Panama, Columbien)
— *albogularis* (Peru)
Jacamaralcyon tridactyla (SO-Brasilien)
Galbula albirostris (Amazonien)
— *tombacea* (Amazonien)
— *cyanescens* (Amazonien)
— *pastazae* (Ecuador)
— *leucogastra* (Südamerika)
— *dea* (Südamerika)
Jacamerops aurea (Costa Rica—Bolivien)

Bucconidae (S. 724—725, 727):

Notharchus macrorhynchus (Mexico—Bolivien)
— *pectoralis* (Panama—Ecuador)
— *ordii* (Venezuela—Brasilien)
Bucco macrodactylus (Columbien—Bolivien)
— *tamatia* (Columbien—Peru)
— *noanamae* (Columbien)
— *capensis* (Columbien—Peru)

Nystalus radiatus (Panama—Ecuador)
— *striolatus* (Amazonien)
Hypnelus ruficollis (Columbien—Venezuela)
Malacoptila fusca (Amazonien)
— *fulvogularis* (Amazonien)
— *mystacalis* (Columbien, Venezuela)
Micromonacha lanceolata (Costa Rica—Brasilien)
Nonnula sclateri (W-Brasilien)
— *brunnea* (Columbien—Peru)
— *ruficapilla* (Panama—Brasilien)
Hapaloptila castanea (Columbien, Ecuador)
Monasa atra (N-Brasilien)
— *flavirostris* (Columbien—Peru)

Capitonidae (S. 725, 728—735):

Capito aurovirens, maculicoronatus, squamatus, hypoleucus, dayi, quinticolor, niger (alle Südamerika, 2. Art auch Panama)
Eubucco richardsoni (Südamerika)
— *bourcierii* (Costa Rica—Peru)
— *versicolor* (Peru, Bolivien)
Semnornis frantzii (Costa Rica, Panama)
— *ramphastinus* (Columbien, Ecuador)
Psilopogon pyrolophus (Malakka, Sumatra)
Megalaima lagrandieri (Indochina)
— *faiostricta* (China—Indochina)
— *rafflesii* (Tenasserim—Borneo)
— *mystacophanos* (Tenasserim—Sumatra)
— *incognita* (Tenasserim, Indochina)
— *henricii* (Mal. Halbins.—Borneo)
— *pulcherrima* (Borneo)
— *eximia* (Borneo)
Gymnobucco peli (W-Afrika, Kongo)
Pogoniulus duchaillui (W-Afrika—Uganda)
Tricholaema melanocephalum (NO-Afrika)
— *flavibuccale* (Unicum, Tanganjika)
— *hirsutum* (W-Afrika—Kenia)
Lybius undatus (NO-Afrika)
— *rubrifacies* (O-Afrika)
— *minor* (Unt. Kongo—Niassasee)
— *melanopterus* (NO- u. O-Afrika)
— *bidentatus* (W-Afrika—Sudan)
— *dubius* (Senegal—Logone)
— *rolleti* (Schari—Uganda)

Indicatoridae (S. 735—737):

Prodotiscus regulus (Kamerun—Kapland)
Indicator maculatus (W-Afrika—Uganda)
— *meliphilus* (O-Afrika—Angola)
— *pumilio* (NO-Kongo)
— *archipelagus* (Siam—Borneo)
— *xanthonotus* (Himalaja)

Ramphastidae (S. 737—738):

Aulacorhynchus sulcatus, calorhynchus, derbianus (alle Südamerika)
— *prasinus* (Mexico—Peru)
— *haematopygus, coeruleicinctis, huallagae* (alle Südamerika)
Pteroglossus torquatus (Mexico—Venezuela)
— *sanguineus, erythropygius, castanotis, aracari, pluricinctus, viridis, inscriptus, bitorquatus, olallae* (alle Südamerika)
Beauharnaisius beauharnaesii (Peru, Brasilien, Bolivien)
Selenidera spectabilis (Honduras—Columbien)
— *culik, reinwardtii, nattereri* (alle Südamerika)
Andigena laminirostris, hypoglauca, cucullata, nigrirostris (alle Südamerika)
Ramphastos citreolaemus (Columbien bis Venezuela)
— *swainsonii* (Honduras—Ecuador)
— *ambiguus* (Panama—Peru)
— *aurantiirostris* (Venezuela, Guayana)
— *tucanus* (Guayanas—Bolivien)

Picidae (S. 739—769):

Picumnus cinnamomeus, rufiventris, castelnau, leucogaster, limae (alle Südamerika)
— *olivaceus* (Honduras—Venezuela)
— *granadensis, nebulosus, borbae, aurifrons, sclateri, steindachneri, squamulatus, pallidus, albosquamatus, guttifer, varzeae, pygmaeus, asterias, pumilus, nigropunctatus, fulvescens* (alle Südamerika)
Nesoctites micromegas (Hispaniola)
Chrysoptilus atricollis (Peru)
Piculus auricularis (Mexico)
— *aeruginosus* (Mexico)
— *simplex* (Honduras—Panama)
— *leucolaemus* (Columbien—Peru)
— *chrysochloros* (Panama—Bolivien)
Campethera taeniolaema (O-Afrika)
— *tullbergi* (Kamerun, Fern. Po)
— *maculosa* (W-Afrika)
Celeus spectabilis (Ecuador—Bolivien)
— *castaneus* (Mexico—Panama)
— *immaculatus* (Panama, Unicum)
— *grammicus* (Columbien—Bolivien)
— *loricatus* (Nicaragua—Ecuador)
— *undatus* (Guayana—Brasilien)
— *torquatus* (Venezuela—Bolivien)
Picus rabiei (Indochina)
Dinopium rafflesii (Siam—Borneo)

Gecinulus viridis (Nepal—Mal. Halbins. u. S-China)
Mulleripicus funebris (Philippinen)
— *fuliginosus* (Philippinen)
— *fulvus* (Celebes)
Dryocopus schulzi (Argentinien)
— *galeatus* (S-Brasilien—Argentinien)
Melanerpes herminieri (Kl. Antillen)
— *caymanensis* (Cayman Insel)
— *striatus* (Hispaniola)
— *pucherani* (Mexico—Ecuador)
— *chrysauchen* (Costa Rica—Columbien)
— *flavifrons* (Brasilien—Argentinien)
Veniliornis fumigatus (Mexico—Bolivien)
— *frontalis* (NW-Argentinien)
— *maculifrons* (Brasilien)
— *affinis* (Columbien—Bolivien)
— *callonotus* (Ecuador—Peru)
— *dignus* (Columbien—Peru)
— *nigriceps* (Columbien—Bolivien)
Dendropicos stierlingi (O-Afrika)
Dendropicos elachus (W-Afrika—Darfur)
— *abessynicus* (Abessinien, Eritrea)
— *poecilolaemus* (Kamerun—Kenia)
— *gabonensis* (Sierra Leone—Kasai)
Dendrocopos leucopterus (Zentral-Asien)
— *maculatus* (Philippinen)
— *temminckii* (Celebes)
— *obsoletus* (Gambia—Tanganjika)
— *dorae* (Arabien)
— *stricklandi* (Mexico)
Sapheopipo noguchii (Okinawa in den Riu-Kiu Inseln)
Polipicus johnstoni (Fernando Po, Kamerun)
Thripias xantholophus (Kamerun—Kenia)
— *pyrrhogaster* (W-Afrika)
Phloeoceastes guatemalensis (Mexico—Panama)
— *pollens* (Columbien—Peru)
— *haematogaster* (Panama—Peru)
Campephilus imperialis (Mexico)

Register der wissenschaftlichen und der deutschen Vogelnamen

halbfett = Hauptbehandlung im Text
kursiv = Erwähnung in den Listen
Stern = Abbildung

Setzfehler und Berichtigungen

(Vergleiche auch die im Register enthaltenen Berichtigungen geringer Abweichungen in der Schreibweise wissenschaftlicher Namen.)

Seite 10, 10. Zeile von unten: „Achsen“ statt „Achen“.

Seite 138, 11. Zeile von unten: „*brasiliensis*“ statt „*buffoni*“.

Seite 150, 10. und 8. Zeile von unten: „*brasiliensis*“ statt „*buffoni*“.

Seite 175, 11.—14. Zeile von unten: Die beiden Rassen *hemachalanus* und *altaicus* sind in Klammern zu setzen, da sie heute meist nicht anerkannt werden und ihr Bereich in dem bei *Gypaëtus barbatus aureus* angegebenen Areal enthalten ist.

Seite 176, 11. Zeile von oben: *Circus buffoni* ist dasselbe wie *C. brasiliensis*. Die Eiermaße beider sind daher zu kombinieren.
„*brasiliensis*“ statt „*buffoni*“ (wie 9. Zeile von oben).

Seite 228, 23. Zeile von oben: „*A. rufa*“ statt „*A. rufa rufa*“.

Seite 427, 12. Zeile von unten: Nach „Magellanstraße“ einfügen: „(siehe aber S. 382)“.

Seite 509, 23. Zeile von oben: Nach „Eigewichte“ einfügen: „(außer *Poicephalus senegalus*)“.

Seite 519, 10. Zeile von oben in Spalte B: „18,2“ statt „19,2“.
Die Maße dieses einzigen Eies von *Bolborhynchus l. lineola* wurden bei Nehrkorn (S. 115) mit 20×18 angegeben, aber schon in der Kladde Schönwetters mit $19{,}5 \times 18{,}2$. Auf die besonders kugelige Gestalt ($k = 1{,}07$!) dieses Eies — es war eben nur eins! — wies der Verfasser in der Einleitung zu den Psittaciformes (S. 508) nicht hin; vielleicht sind hier wie bei *Charmosyna* (*placentis pallidior* nach S. 513, $k = 1{,}10$) und *Cyanoramphus* (*unicolor* nach S. 529, $k = 1{,}10$) Arten mit kugeliger Eischale die Ausnahme.

Seite 592, 3. Zeile von unten: „21,3“ statt „21,8“.

Seite 598, 12. Zeile von unten: „*javanensis*“ statt „*javanicus*“

Seite 618, 6. Zeile von oben: „*Ninox n. novaeseelandiae*“ statt „*Ninox novaeseelandiae*“.

Seite 639, 17. Zeile von unten: „*sclateri*“ statt „*scalteri*“.

Seite 679, 7. Zeile von unten: „*Chaetocercus*“ statt „*Chateocercus*“.



1967 erscheint der 43. Band

Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Berlin

Herausgegeben vom Institut für Spezielle Zoologie und Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin

Schriftleitung: Dr. G. HARTWICH und Dr. H.-E. GRUNER

Die „Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum" wurden 1898 gegründet, haben heute also eine langjährige Tradition. Wie es im Geleitwort des ersten Heftes hieß, sollte die Zeitschrift vorwiegend der Systematik und Zoogeographie dienen. Dieser, früheren Begriffen von musealer Forschungstätigkeit entsprechende Rahmen ist heute längst gesprengt. In demselben Maße, in dem die moderne Systematik die Resultate der anderen zoologischen Disziplinen für sich heranzieht, hat sich der Inhalt der „Mitteilungen" über die seit je gepflegte Chorologie hinaus auch auf die Morphologie, Anatomie, Ökologie, Ontogenie, Phylogenie u. a. m. ausgedehnt. Diese Vielseitigkeit in der Thematik der Beiträge zeigt sich am deutlichsten in den seit dem letzten Kriege herausgekommenen Jahrgängen. Damit hat diese Zeitschrift nicht mehr im wesentlichen nur eine systematische Blickrichtung, sondern sie ist ein Organ der zoologischen Forschung schlechthin geworden.

Erscheinungsweise: halbjährlich 1 Heft — 240 Seiten — im Format 16,7 × 24 cm, mit Abbildungen. Bezugspreis je Heft nach Umfang und Ausstattung etwa MDN 25,— bis 40,—

Bestellungen durch eine Buchhandlung erbeten



AKADEMIE-VERLAG · BERLIN

G. A. Schmidt

Evolutionäre Ontogenie der Tiere

(Übersetzung aus dem Russischen)

In deutscher Sprache bearbeitet und herausgegeben von H. G. Herbst

1966. XII, 364 Seiten — 108 Abbildungen — 14 Tabellen — gr. 8° — Lederin MDN 36,–

In einem Zeitraum von mehr als 40 Jahren hat der Verfasser durch eigene Beiträge die embryologische Forschung wesentlich gefördert. In der deutschen Bearbeitung gibt das Werk des bekannten sowjetischen Embryologen einen lehrbuchmäßigen Überblick, wesentlich gestützt auf die vergleichend morphologische, aber auch auf die experimentelle und die ökologische Arbeitsrichtung der Ontogenie.

Bestellungen durch eine Buchhandlung erbeten



AKADEMIE-VERLAG · BERLIN

